

쿨프렙산 복용 안내문 및 주의사항

| 예약 날짜 :

| 예약 시간 :

| 쿨프렙산 1차 복용 방법 (1차와 2차 복용방법은 아래와 같이 동일합니다)



- 1 A제(1포)와 B제(1포)를 500mL통에 넣은 후, 찬물 500mL를 표시선까지 채운 다음 뚜껑을 닫고 완전히 녹을 때까지 흔들어 줍니다.
- 2 조제한 쿨프렙액 500mL를 15분 간격으로 2회 복용합니다. (1000mL)
- 3 추가로 물 500mL를 복용합니다.

쿨프렙액 500mL 2번 복용 + 물 500mL 1번 복용

1차

검사 전날
오후 7시
~8시까지



쿨프렙액 500mL 2번 복용 + 물 500mL 1번 복용

2차

검사 당일
새벽 4시
~5시까지



대장내시경 하제 복용시 주의사항

- 심장질환, 뇌질환, 천식, 만성 폐질환, 고혈압, 협심증, 심근경색, 당뇨 등으로 현재 복용중인 약물이 있는 경우 담당의사에게 반드시 말씀하여 주십시오.
- 현재 복용중인 처방약물 중에 항응고제, 항혈전제(아스피린, 와파린, 디스그렌, 플라빅스, 프레탈, 비알빅스 등)를 복용하시는 경우 의사와 사전 협의 후 검사 전 약 1주일 정도 복용을 중단하시는 것이 좋습니다.
- 고혈압, 심장질환으로 약을 드시는 분은 검사 당일 아침 6시 이전에 소량의 물과 함께 약을 드십시오.
- 검사 당일에는 혈당조절 약물이거나 인슐린 주사는 투여하지 마십시오.
- 대장정결제 복용이 어려울 수 있으나 장 정결상태가 불량할 시에는 검사가 제대로 진행되지 못할 수도 있으므로 안내 받으신 대로 모두 복용하셔야 검사가 가능합니다.

대장내시경을 위한 식이조절 가이드

| 검사 3일전 식사방법

대장내시경 검사 3일전부터 조절해야 하는 음식입니다.

식이조절이 되지 않은 경우 정확한 검사가 불가능하므로 반드시 조절이 필요합니다.

피할 음식

잡곡밥, 검은쌀, 현미밥, 깨죽 등...



김치류, 나물류, 해조류(미역, 김, 다시마), 콩나물



씨 있는 과일(수박, 참외, 딸기, 포도, 키위 등),
고추씨, 옥수수, 견과류(땅콩, 잣, 호두)



드릴 수 있는 음식

흰쌀밥, 흰죽만 가능



계란류, 두부류, 목, 국물류, 빵종류, 맑은 음료류
(맑은 주스, 녹차, 이온음료 등)



사과, 배, 바나나, 감자



| 검사 1일전 식사방법

- 저녁 식사(흰죽+간장 또는 국물, 카스테라, 우유 등)는 오후 5시 이전에 가볍게 드시고, 정해진 시간에 약물을 복용하십시오. (이후 약물복용 이외에는 절대 금식)
- 검사 예정 3시간 전 부터는 추가적인 물 음용을 삼가해 주십시오.



고려대학교 안암병원 종합건강진단센터

02) 920-5491,5106